


Pèrdua de consciència



Concepte

La pèrdua de coneixement és una situació en què la persona afectada perd la capacitat per relacionar-se amb el món que l'envolta però manté inicialment la respiració i la funció cardíaca.

Exploració

• Signes i símptomes: atordiment; pell pàl·lida, freda i amarada de suor; pols lent i feble; sensació de mareig i fluïxesa a les cames en cas de lipotímia; presència de ferides o contusions bàsicament al cap o zona cervical; convulsions en cas d'epilèpsia; alteracions visuals i auditives.

Actuació

En cas de lipotímia, síncope o coma:

- Cal col·locar la víctima en posició estirada boca amunt amb les cames aixecades 45° o en posició lateral de seguretat si està en coma.
- S'ha d'afluixar la roba que pugui oprimir-la.
- No se l'ha de deixar mai sola.
- No se li pot donar res per menjar ni per beure.
- Cal iniciar les maniobres de RCP si entra en aturada cardiorespiratòria.

En cas de crisi convulsiva epilèptica:

- No s'ha de subjectar la víctima durant les convulsions.
- Cal apartar els objectes del voltant de la víctima.
- S'ha d'afluixar la roba del voltant del coll i la cintura.
- S'ha d'intentar introduir un objecte dur a la boca per evitar que es mossegui la llengua.
- Cal col·locar qualsevol objecte que serveixi de coixí sota el cap de la víctima, mantenint permeable la via aèria.
- Cal col·locar-la en posició lateral de seguretat en el període postconvulsiu.
- S'ha de recomanar sistemàticament revisió mèdica.