

Lesions oculars



Concepte

Lesions produïdes als ulls que poden ser degudes a cossos estranys, productes químics, conjuntivitis fotoelèctrica o cops a l'ull.

Exploració

• Signes i símptomes:

- . En cas de cos estrany i productes químics: llagimeig, fotofòbia, enrogiment, inflamació, disminució de l'agudesesa visual i dolor.
- . En cas de conjuntivitis fotoelèctrica: dolor intens, espasme de la parpella i fotofòbia.
- . En cas de cop a l'ull: hematoma periorbitari, visió borrosa, de llums o de taques negres.

• Conseqüències: cremades químiques o actíniques i pèrdua de la visió.

• Criteris de gravetat:

- . En cas de cos estrany: dependent de l'impacte, del volum i de la naturalesa del cos.
- . En cas de substància química: dependent del tipus i de la concentració de la substància química i del temps d'exposició.
- . En cas de conjuntivitis fotoelèctrica: dependent del temps d'exposició a la font i del tipus i la intensitat que tingui.
- . En cas de cop a l'ull: dependent de la seva potència.

Actuació

En cas de cos estrany:

- Cal rentar amb aigua o sèrum durant 20 minuts.
- Si està enclavat: cal tranquil·litzar la víctima i no extreure'l.
- No s'han de fer utilitzar col·liris ni pomades.
- Cal tapar l'ull amb gases humides o un mocador.
- S'ha de traslladar la víctima al centre sanitari adequat.

En cas d'àcids, àlcalis i càustics:

- Cal rentar amb aigua a raig i en gran quantitat durant vint minuts amb els ulls oberts.
- No s'ha d'aplicar pomada ni col·liri.
- No s'han de fregar les parpelles.
- Cal tapar amb gases humides.
- Cal traslladar el pacient al centre sanitari de referència.

En cas de conjuntivitis fotoelèctrica:

- Cal rentar amb aigua o sèrum entre deu i quinze minuts.
- Cal tapar amb gases.
- Cal traslladar el pacient al centre sanitari de referència.

En cas de cops a l'ull:

- S'ha de netejar amb aigua abundant.
 - Cal aplicar compreses fredes.
 - S'ha de tapar l'ull lesionat.
 - Cal remetre sempre al centre sanitari de referència.
-