

Estàndard de qualitat de prescripció farmacèutica

Medicina familiar i comunitària

PER ALS EQUIPS D'ATENCIÓ PRIMÀRIA

2011

www.gencat.cat/ics
www.portalics

Fàrmacs recomanats

Antihipertensius

Betablocadors: atenolol, bisoprolol, carvedilol, metoprolol
Diürètics: hidroclorotiazida, amilorida, clortalidona, indapamida
IECA: captopril, enalapril, lisinopril, perindopril, ramipril, trandolapril
Calcioantagonistes: diltiazem, verapamil, amlodipina

Antiulcerosos

Antiàcids: almagat, algedrat, magaldrat i d'altres sals d'alumini i magnesi
Anti-histamínic H₂: ranitidina
Inhibidors de la bomba de protons: omeprazole
Altres: misoprostol

Antiinflamatoris no esteroïdals (AINE)

AINE sistèmics: ibuprofèn, naproxèn, diclofenac

Antibiòtics

Penicil·lines: amoxicil·lina, amoxicil·lina-àcid clavulànic, penicil·lina G, penicil·lina V, cloxacil·lina
Macròlids: eritromicina, claritromicina, josamicina
Quinolones: àcid pipemidic, norfloxacina
Altres: fosfomicina-trometamol

Hipolipemians

Resines: colestiramina
Fibrats: gemfibrozil
Estatines: simvastatina, pravastatina, lovastatina

Antiasmàtics

β₂-adrenèrgics inhalats d'acció curta: salbutamol, terbutalina
β₂-adrenèrgics inhalats de llarga durada: salmeterol, formoterol
Anticolinèrgics inhalats: bromur d'ipratropi
Corticoides inhalats: budesònida, beclometasona
Nota: NO s'inclou cap associació de principis actius recomanats

Antidepressius

Tricíclics i relacionats: nortriptilina, imipramina, clomipramina, amitriptilina
Inhibidors selectius de la recaptació de serotonina (ISRS): citalopram, fluoxetina, paroxetina, sertralina

Ansiolític i hipnòtic

Benzodiazepines: alprazolam, lorazepam, diazepam, clorazepat dipotàssic, lorazepam

Antidiabètics

Sulfonilurees: glibenclàmida, gliclazida, glimepirida, gliquidona
Biguanides: metformina

Composició del numerador de l'indicador del CANM

Àcid nicotínic/laropirant	Exenatida	Risedronat mensual
Agomelatina	Fesoterodina	Rosuvastatina
Alendronat/colecalciferol	Hidromorfona	Sildenafil
Aliskiren	Hormona paratiroïdal humana recombinant	Sitagliptina
Aliskiren/hidroclorotiazida	Ibandronat	Sitagliptina/metformina
Atorvastatina/amlodipina	Indacaterol	Telitromicina (reavaluada)
Azitromicina col·liri	Insulina glulisina	Valsartan/amlodipina
Beclometasona/formoterol	Ivabradina	Valsartan/amlodipina/hidroclorotiazida
Clofazol	Pioglitazona/metformina	Vildagliptina
Duloxetina	Ranolazina	Vildagliptina/metformina
Enalapril/lercanidipina	Retapamulina	

IECA: inhibidors de l'enzim convertidor d'angiotensina

A. INDICADORS GLOBAIS (mesurats en envasos)	OBJECTIU	PUNTAUCCIÓ
A.1. Utilització de fàrmacs d'eficàcia provada (valor Intrínsec farmacològic [VIF] elevat) % especialitats farmacèutiques amb VIF elevat / total d'especialitats farmacèutiques	≥ 92 %	(5) 5
A.2. Utilització d'especialitats farmacèutiques genèriques (EFG) % EFG / total d'especialitats farmacèutiques	≥ 35 % ≥ 33 %	(15) 15 10
A.3. Seguiment recomanacions del Comitè d'Avaluació de Nous Medicaments (CANM) (*) % fàrmacs catalogats pel CANM com a "no valorable: informació insuficient" o "no suposa un avenç terapèutic" / total d'especialitats farmacèutiques	≤ 1,2 % ≤ 1,5 % ≤ 1,7 %	(15 + 5) (**) 15 10 5
<p>(*) El numerador inclou els medicaments avaluats pel CANM que han estat comercialitzats al llarg dels darrers 5 anys (2006-2010) i catalogats com a "no valorable: informació insuficient" o "no suposa un avenç terapèutic". S'han eliminat del numerador els medicaments avaluats pel CANM, però en els quals la prescripció inicial és realitzada pel facultatiu especialista, i aquells comercialitzats abans de 2006 a excepció dels que: a) han estat avaluats en una nova indicació, sempre que aquesta nova indicació tingui una prevalença més gran a l'anterior i el fàrmac ocupi un lloc important en el tractament de la patologia; b) han estat reavaluats pel CANM al llarg dels darrers 5 anys (2006-2010).</p> <p>(**) Al final de l'any s'atorguen 5 punts addicionals segons el seguiment de les recomanacions del CANM fetes l'any 2011 (l'objectiu numèric es correspon amb el valor que correspon al percentil 50).</p>		
PUNTAUCCIÓ MÀXIMA INDICADORS GLOBAIS		40

B. INDICADORS ESPECÍFICS (mesurats en DDD)	OBJECTIU	PUNTAUCCIÓ
B.1. Utilització d'antihipertensius % diürètics* sols o associats als recomanats / total d'antihipertensius* % ARAL / (IECA + ARAL) % fàrmacs antihipertensius recomanats / total d'antihipertensius* * S'exclou la furosemida, atès que no s'utilitza com a agent antihipertensiu	≥ 30 %, ≥ 27 % ≤ 32 %, ≤ 37 % ≥ 70 %, ≥ 65 %	(15) 3,1 6,4 6,4
B.2. Utilització d'antiulcerosos DHD65* del total d'antiulcerosos * Dosis diàries definides/1.000 habitants dia estandarditzades segons el nivell d'envelliment de l'ICS % fàrmacs antiulcerosos recomanats / total d'antiulcerosos	≤ 100, ≤ 110 ≥ 90 %, ≥ 85 %	(10) 6,4 4,2
B.3. Utilització d'antiinflamatoris no esteroïdals (AINE) DHD65* del total d'AINE * Dosis diàries definides/1.000 habitants dia estandarditzades segons el nivell d'envelliment de l'ICS % fàrmacs AINE recomanats / total d'AINE	≤ 37, ≤ 45 ≥ 82 %, ≥ 77 %	(10) 6,4 4,2
B.4. Utilització d'antibiòtics Si el nombre de DHD d'antibiòtics (taxa d'exposició poblacional) és ≤ 8, s'obtenen directament 10 punts i no es valoren la resta dels indicadors d'antibiòtics DHD65* DEL TOTAL D'ANTIBIÒTICS * Dosis diàries definides/1.000 habitants dia estandarditzades segons el nivell d'envelliment de l'ICS % penicil·lines / total d'antibiòtics % amoxicil·lina / amoxicil·lina + amoxicil·lina-clavulànic % fàrmacs antibiòtics recomanats / total d'antibiòtics	≤ 9, ≤ 10 ≥ 60 % ≥ 50 % ≥ 75 %, ≥ 70 %	(10) 6,4 1 1 2,1
B.5. Utilització d'hipolipemians Mesurat en envasos per tal d'obviar el biaix que suposa la DDD d'atorvastatina % fàrmacs hipolipemians recomanats / total d'hipolipemians	≥ 70 %, ≥ 66 %	(10) 10,5
B.6. Utilització d'antiasmàtics (asma i MPOC) % associacions β ₂ llarga durada + corticoides / total d'antiasmàtics % fàrmacs antiasmàtics recomanats* / total d'antiasmàtics* * Les associacions de β ₂ de llarga durada i corticoides estan excloses al numerador i denominador	≤ 25 %, ≤ 30 % ≥ 75 %, ≥ 70 %	(10) 4,2 6,4
B.7. Utilització d'antidepressius % fàrmacs antidepressius recomanats / total d'antidepressius	≥ 65 %, ≥ 60 %	(10) 10,5
B.8. Utilització d'ansiolítics i hipnòtics DHD65* del total d'ansiolítics i hipnòtics * Dosis diàries definides/1.000 habitants dia estandarditzades segons el nivell d'envelliment de l'ICS % fàrmacs ansiolítics i hipnòtics recomanats / total d'ansiolítics i hipnòtics	≤ 66, ≤ 80 ≥ 87 %, ≥ 85 %	(10) 6,4 4,2
B.9. Utilització d'antidiabètics orals % fàrmacs antidiabètics orals recomanats / total d'antidiabètics orals	≥ 85 %, ≥ 80 %	(5) 5,3
PUNTAUCCIÓ MÀXIMA INDICADORS ESPECÍFICS		90

PUNTAUCCIÓ MÀXIMA ÍNDEX SINTÈTIC (A+B) = 130