

# Estàndard de qualitat de prescripció farmacèutica

## Medicina familiar i comunitària

INDIVIDUAL

2011

[www.gencat.cat/ics](http://www.gencat.cat/ics)  
[www.portalics](http://www.portalics)

### Fàrmacs recomanats

#### Antihipertensius

**Betablocadors:** atenolol, bisoprolol, carvedilol, metoprolol  
**Diürètics:** hidroclorotiazida, amilorida, clortalidona, indapamida  
**IECA:** captopril, enalapril, lisinopril, perindopril, ramipril, trandolapril  
**Calcioantagonistes:** diltiazem, verapamil, amlodipina

#### Antiulcerosos

**Antiàcids:** almagat, algedrat, magaldrat i d'altres sals d'alumini i magnesi  
**Antihistamínic H<sub>2</sub>:** ranitidina  
**Inhibidors de la bomba de protons:** omeprazole  
**Altres:** misoprostol

#### Antiinflamatoris no esteroïdals (AINE)

**AINE sistèmics:** ibuprofèn, naproxèn, diclofenac

#### Antibiòtics

**Penicil·lins:** amoxicil·lina, amoxicil·lina-àcid clavulànic, penicil·lina G, penicil·lina V, cloxacil·lina  
**Macròlids:** eritromicina, claritromicina, josamicina  
**Quinolones:** àcid pipemidic, norfloxacina  
**Altres:** fosfomicina-trometamol

#### Hipolipemians

**Resines:** colestiramina  
**Fibrats:** gemfibrozil  
**Estatines:** simvastatina, pravastatina, lovastatina

#### Antiasmàtics

**β<sub>2</sub>-adrenèrgics inhalats d'acció curta:** salbutamol, terbutalina  
**β<sub>2</sub>-adrenèrgics inhalats de llarga durada:** salmeterol, formoterol  
**Anticolinèrgics inhalats:** bromur d'ipratropi  
**Corticoides inhalats:** budesònida, beclometasona  
**Nota:** NO s'inclou cap associació de principis actius recomanats

#### Antidepressius

**Tricíclics i relacionats:** nortriptilina, imipramina, clomipramina, amitriptilina  
**Inhibidors selectius de la recaptació de serotonina (ISRS):** citalopram, fluoxetina, paroxetina, sertralina

#### Ansiolítics i hipnòtics

**Benzodiazepines:** alprazolam, lormetazepam, diazepam, clorazepat dipotàssic, lorazepam

#### Antidiabètics

**Sulfonilurees:** glibenclamida, gliclazida, glibemipirida, gliclidona  
**Biguanides:** metformina

#### Composició del numerador de l'indicador del CANM

Àcid nicotínic/laropirant	Exenatida	Risedronat mensual
Agomelatina	Fesoterodina	Rosuvastatina
Alendronat/colecalciferol	Hidromorфона	Silodosina
Aliskirèn	Hormona paratiroïdal humana recombinant	Sitagliptina
Aliskirèn/hidroclorotiazida	Ibandronat	Sitagliptina/metformina
Atorvastatina/amlodipina	Indacaterol	Telitromicina (reavaluada)
Azitromicina col·liri	Insulina glulisina	Valsartan/amlodipina
Beclometasona/formoterol	Ivabradina	Valsartan/amlodipina/hidroclorotiazida
Clofazol	Pioglitazona/metformina	Vildagliptina
Duloxetina	Ranolazina	Vildagliptina/metformina
Enalapril/lercanidipina	Retapamulina	

IECA: inhibidors de l'enzim convertidor d'angiotensina

A. INDICADORS GLOBAIS (mesurats en envasos)	OBJECTIU	PUNTUACIÓ
<b>A.1. Utilització de fàrmacs d'eficàcia provada (valor Intrínsec farmacològic [VIF] elevat)</b> % especialitats farmacèutiques amb VIF elevat / total d'especialitats farmacèutiques	≥ 92 %	(3) 3
<b>A.2. Utilització d'especialitats farmacèutiques genèriques (EFG)</b> % EFG / total d'especialitats farmacèutiques	≥ 35 % ≥ 33 %	(12) 12 8
<b>A.3. Seguiment recomanacions del Comitè d'Avaluació de Nous Medicaments (CANM) (*)</b> % fàrmacs catalogats pel CANM com a "no valorable: informació insuficient" o "no suposa un avenç terapèutic" / total d'especialitats farmacèutiques	≤ 1,2 % ≤ 1,5 % ≤ 1,7 %	(12 + 3) (**) 12 8 4

(\*) El numerador inclou els medicaments avaluats pel CANM que han estat comercialitzats al llarg dels darrers 5 anys (2006-2010) i catalogats com a "no valorable: informació insuficient" o "no suposa un avenç terapèutic". S'han eliminat del numerador els medicaments avaluats pel CANM, però en els quals la prescripció inicial és realitzada pel facultatiu especialista, i aquells comercialitzats abans de 2006 a excepció dels que: a) han estat avaluats en una nova indicació, sempre que aquesta nova indicació tingui una prevalença més gran a l'anterior i el fàrmac ocupi un lloc important en el tractament de la patologia; b) han estat reavaluats pel CANM al llarg dels darrers 5 anys (2006-2010).

(\*\*) Al final de l'any s'atorguen 3 punts addicionals segons el seguiment de les recomanacions del CANM fetes l'any 2011 (l'objectiu numèric es correspon amb el valor que correspon al percentil 50).

PUNTUACIÓ MÀXIMA INDICADORS GLOBAIS 30

B. INDICADORS ESPECÍFICS (mesurats en DDD)	OBJECTIU	PUNTUACIÓ
<b>B.1. Utilització d'antihipertensius</b> % diürètics* sols o associats als recomanats / total d'antihipertensius* % ARAII / (IECA + ARAII) % fàrmacs antihipertensius recomanats / total d'antihipertensius* * S'exclou la furosemida, atès que no s'utilitza com a agent antihipertensiu	≥ 30 %, ≥ 27 % ≤ 32 %, ≤ 37 % ≥ 70 %, ≥ 65 %	(10) 2,1 4,3 4,3
<b>B.2. Utilització d'antiulcerosos</b> % fàrmacs antiulcerosos recomanats / total d'antiulcerosos	≥ 90 %, ≥ 85 %	(8) 8,4
<b>B.3. Utilització d'antiinflamatoris no esteroïdals (AINE)</b> % fàrmacs AINE recomanats / total d'AINE	≥ 82 %, ≥ 77 %	(8) 8,4
<b>B.4. Utilització d'antibiòtics</b> Si el nombre de DHD d'antibiòtics (taxa d'exposició poblacional) és ≤ 8, s'obtenen directament 8 punts i no es valoren la resta dels indicadors d'antibiòtics DHD DEL TOTAL D'ANTIBIÒTICS Dosis diàries definides/1.000 habitants dia NO estandarditzades segons el nivell d'envelliment de l'ICS % penicil·lines / total d'antibiòtics % amoxicil·lina / amoxicil·lina + amoxicil·lina-clavulànic % fàrmacs antibiòtics recomanats / total d'antibiòtics	≤ 9, ≤ 10 ≥ 60 % ≥ 50 % ≥ 75 %, ≥ 70 %	(8) 4,2 1 1 2,1
<b>B.5. Utilització d'hipolipemians</b> Mesurat en envasos per tal d'obviar el biaix que suposa la DDD d'atorvastatina % fàrmacs hipolipemians recomanats / total d'hipolipemians	≥ 70 %, ≥ 66 %	(8) 8,4
<b>B.6. Utilització d'antiasmàtics (asma i MPOC)</b> % associacions β <sub>2</sub> llarga durada + corticoides / total d'antiasmàtics % fàrmacs antiasmàtics recomanats* / total d'antiasmàtics* * Les associacions de β <sub>2</sub> de llarga durada i corticoides estan excloses al numerador i denominador	≤ 25 %, ≤ 30 % ≥ 75 %, ≥ 70 %	(8) 3,1 5,3
<b>B.7. Utilització d'antidepressius</b> % fàrmacs antidepressius recomanats / total d'antidepressius	≥ 65 %, ≥ 60 %	(8) 8,4
<b>B.8. Utilització d'ansiolítics i hipnòtics</b> % fàrmacs ansiolítics i hipnòtics recomanats / total d'ansiolítics i hipnòtics	≥ 87 %, ≥ 85 %	(8) 8,4
<b>B.9. Utilització d'antidiabètics orals</b> % fàrmacs antidiabètics orals recomanats / total d'antidiabètics orals	≥ 85 %, ≥ 80 %	(4) 4,3

PUNTUACIÓ MÀXIMA INDICADORS ESPECÍFICS 70

PUNTUACIÓ MÀXIMA ÍNDEX SINTÈTIC (A+B) = 100