

16.34

Jonqueres de jonc boval (*Scirpus holoschoenus* var. *australis*) i herbassars graminoides de cesquera (*Saccharum ravennae*), de depressions humides de les interdunes litorals



Jonquera de jonc boval darrere la platja de la Fonollera (Baix Empordà). A. Ferré i J. Vigo

Aspecte

Comunitats denses dominades per gramínies altes o per plantes junciformes.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Litoral marítim.
Ambients que ocupa – Depressions humides interdunars.
Clima – Mediterrani marítim.
Substrat i sòl – Sorres litorals fixades i inundades temporàniament per aigua no marina.

Flora principal

| | dom. | ab. | sign. | sec. |
|--|------|-----|-------|------|
| <i>Saccharum ravennae</i> (cesquera) | | • | • | |
| <i>Scirpus holoschoenus</i> var. <i>australis</i> (jonc boval) | | • | | |
| <i>Schoenus nigricans</i> (jonc negre) | | • | | |
| <i>Plantago crassifolia</i> (pedrenca marina) | | • | | |
| <i>Hypochoeris radicata</i> (peluda) | | | • | |

Sintàxons o altres unitats tipològiques que hi corresponen

Eriantho-Holoschoenetum australis O. Bolòs 1962

Distribució dins el territori català

Territori catalanídic.

Gestió, usos i problemes de conservació

En temps recents, la transformació del litoral marítim ha comportat la desaparició quasi completa dels herbassars de cesquera. De jonqueres, encara se'n conserven, poc o molt.



Cesquera. R.M. Masalles

Indicadors d'interès de conservació

- Distribució general dins Europa ▶ ② costes europees
- Freqüència dins el territori català ▶ ⑤ molt rar
- Forma d'implantació territorial ▶ ② superfícies mitjanes
- Diversitat florística ▶ ① baixa
- Grau de maduresa ▶ ① estable
- Amenaça ▶ ③ molt amenaçat

■ **Tipus d'hàbitats d'interès comunitari (annex I de la Directiva 97/62/UE) corresponents**

2190 Depressions humides interdunars

■ **Unitats de la llegenda de la Cartografia dels hàbitats a Catalunya (1:50.000) que el representen**

16b Dunes i zones interdunars amb vegetació natural no nitròfila

