

15f Brolles i timonedes amb ruac (*Ononis tridentata*), trincola (*Gypsophila hispanica*)..., dels sòls guixencs, sobretot a les contrades interiors

► Aspecte

Brolles i timonedes d'alçària variable (0,3-1 m) en funció de les plantes que hi dominen. S'hi reconeix un estrat arbustiu clar, sota del qual hi ha un estrat herbaci de recobriment variable. En formen part un conjunt reduït d'espècies adaptades a la presència de guix (sulfat càlcic) al sòl.

Afectades puntualment per incendis, sobrepastura i canvis en els usos del sòl. La rompuda sovint comporta moviments de terres importants.

Les comunitats més madures es regeneren amb dificultat quan han estat alterades per la sobreexplotació o per l'erosió del sòl.

► Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Terra baixa: contrades mediterrànies interiors.

Ambients que ocupa – Espais oberts, costers i terrenys erosionats.

Clima – Mediterrani continental.

Substrat i sòl – Sòls guixencs (amb sulfat càlcic).

► Hàbitats CORINE

15.921 Brolles amb dominància de trincola (*Gypsophila hispanica*), de sòls guixencs, de les contrades interiors

Ononidetum tridentatae Br.-Bl. et O. Bolòs 1957
Exclusiu. Dominant, juntament amb el 15.923

15.922 Timonedes amb *Helianthemum squamatum*, de terraprimis i sòls compactes, guixencs, sovint amb crosta de guix superficial

Herniario fruticosae-Helianthemum squamati
O. Bolòs 1996

Helianthemum squamati Br.-Bl. et O. Bolòs 1957

Exclusiu. Minoritari.

15.923 Brolles de ruac (*Ononis tridentata*), de sòls argilosos guixencs

Ononidetum tridentatae Br.-Bl. et O. Bolòs 1957

Erico-Thymelaetum tinctoriae (Br.-Bl. et al.) A. et O. Bolòs 1950 subass. *ononidetosum*

Exclusiu. Dominant juntament amb el 15.921

15.924+ Timonedes de *Lepidium subulatum*, de sòls guixencs pulverulents, de les contrades interiors

Lepidietum subulati Br.-Bl. et O. Bolòs 1957

Exclusiu. Minoritari

► Flora principal

	dom.	ab.	sign.	sec.
Arbustos				
<i>Ononis tridentata</i> (ruac)		•		•
<i>Gypsophila hispanica</i> (trincola)		•		•
<i>Rosmarinus officinalis</i> (romani)			•	
Mates i herbes				
<i>Helianthemum squamatum</i>		•		•
<i>Lepidium subulatum</i>		•		•
<i>Herniaria fruticosa</i>			•	•
<i>Brachypodium retusum</i> (llostó)			•	
<i>Thymus vulgaris</i> (farigola, timó)			•	
<i>Reseda stricta</i> (gandalla estreta)				•
<i>Launaea pumila</i> (llició bord)				•
<i>Artemisia herba-alba</i> (botja pudent)				•
Líquens				
<i>Psora decipiens</i>			•	
<i>Diploschistes diacapsis</i>			•	
<i>Squamarina</i> spp.			•	
<i>Fulgensia</i> spp.			•	

► Tipus d'hàbitats d'interès comunitari

1520* Vegetació gipsícola ibèrica (*Gypsophiletalia*)

► Distribució dins el territori català

Territoris sicòric, ausossegàrric i catalanídic central i meridional; Prepirineus meridionals centrals.

► Usos i problemes de conservació

Utilitzades, sobretot en el passat, com a pastura per al bestiar ovi i cabrum.

► Superfície cartografiada

6.593,4415 ha

