

# 32aa Boixedes (matollars de *Buxus sempervirens*), de la muntanya mitjana (i de les contrades mediterrànies)

## ► Aspecte

Matollars o bosquines d'alçada variable (0,5-2 m) que, tot i essent sovint molt extensos, solen estar formats per claps discontinus, separats per superfícies pradenques o rocalloses. La dominància de l'espècie principal els dóna un aspecte relativament austri i constant al llarg de tot l'any.

La definició d'aquesta unitat basada en l'abundància del boix, que té una ecologia força àmplia, fa que presenti una certa diversitat, reflectida sobretot en la resta del component vegetal.

## ► Ecologia

**Àrees biogeogràfiques** – Muntanya mitjana i muntanya mediterrània.

**Ambients que ocupa** – Sobretot vessants rocallosos, carenes i serrats; per abandonament de la pastura o per desforestació, també vessants amb bon sòl.

**Clima** – Medieuropeu o mediterrani muntanyenc.

**Substrat i sòl** – Roques més o menys carbonàtiques. Quasi sempre sòls rocallosos, rics en carbonats, generalment bàsics.

## ► Flora principal

	dom.	ab.	sign.	sec.
<b>Estrat arbustiu</b>				
<i>Buxus sempervirens</i> (boix)	•		•	
<i>Ononis fruticosa</i> (gavó)		•	•	
<i>Amelanchier ovalis</i> (corner)		•	•	
<i>Genista scorpius</i> (argelaga)				•
<b>Estrats subarbustiu i herbaci</b>				
<i>Hepatica nobilis</i> (herba fetgera)		•	•	
<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (boixerola)		•		
<i>Primula veris</i> subsp. <i>columnae</i> (cucut)			•	
<i>Teucrium chamaedrys</i> (camedris)				•
<i>Cruciata glabra</i> (creuera)				•

## ► Distribució dins el territori català

Pirineus i territoris olositànic, ausosegàrric i catalani-dic central i meridional, des de pocs metres d'altitud fins a uns 1.800 m.

## ► Usos i problemes de conservació

Sense ús.

Allà on el sòl és més o menys profund, el creixement del boc pot reduir-ne la superfície a mitjà termini.

Es troba secundàriament molt estès a causa de l'abandonament de la pastura en grans àrees antigament desforestades. A les terres més rocalloses, és una vegetació permanent.

## ► Hàbitats CORINE

32.641+ Boixedes (matollars de *Buxus sempervirens*) de la muntanya mitjana (i de les contrades mediterrànies)

*Viola willkommii-Quercetum fagineae* Br.-Bl. et O. Bolòs 1950

*Buxo sempervirentis-Juniperetum phoeniceae* Rivas Mart. 1969 (incl. *Stipo-Juniperetum phoeniceae* auct.)

*Jasmino-Buxetum sempervirentis* O. Bolòs 1973

*Buxo-Cistetum laurifolii* Carreras, Carrillo, Masalles, Ninot et Vigo 1993

*Buxo sempervirentis-Quercetum pubescentis* Br.-Bl. (1915) 1932

*Teucrio-Santolinetum pectinis* X. Font 1989

*Rhamno saxatilis-Buxetum* (De Bannes-Puygiron) Tx. 1952

*Buxo sempervirentis-Fagetum* Br.-Bl. et Suspl. 1937 em. Br.-Bl. 1952

*Helleboro-Fagetum* O. Bolòs (1948) 1957

*Pteridio-Quercetum pubescentis* (Suspl.) O. Bolòs 1988

etc.

Exclusiu de la unitat i, de molt, el més probable.

32.642+ Matollars d'*Ononis fruticosa*, sovint amb *Buxus sempervirens* (boix), calcícoles, de la muntanya mitjana poc plujosa i de les contrades interiors

*Ononido fruticosae-Buxetum sempervirentis* (Br.-Bl. et O. Bolòs) O. Bolòs 1960

Exclusiu de la unitat, però poc probable, atesa la seva distribució geogràfica reduïda.

## ► Tipus d'hàbitats d'interès comunitari

5110 Boixedes xertermòfiles permanents, dels vessants rocosos [només si són dominades pel boix i són formacions permanents]

► Superficie cartografiada  
24.871,5173 ha

