

## 32d Cadequers (màquies o garrigues amb *Juniperus oxycedrus arborescent*), no litorals

### ► Aspecte

Matollars o bosquines irregulars, per un seguit d'1 a 2 m d'alçària, en què abunda el càdec, sovint en forma d'individus arborescents, acompanyat d'altres arbusts xeròfils mediterranis i d'algun arbret (pi blanc, carrasca). Entremig, a les petites clarianes, hi ha mates i herbes, relativament banals, i roca al descobert. Quasi totes les plantes són de fulla estreta, fins i tot acicular, i més o menys endurida, en consonància amb la sequedat ambiental de l'hàbitat a l'estiu i la poca reserva d'aigua edàfica de què sol disposar.

### ► Ecologia

**Àrees biogeogràfiques** – Terra baixa (més aviat contrades interiors). Muntanya mediterrània. Més rarament, muntanya mitjana: estatge submontà.

**Ambients que ocupa** – Costers solells, serrats i carenes, en llocs molt calents a l'estiu, amb acusats contrastos de temperatura.

**Clima** – Mediterrani, preferentment continental, o mediterrani muntanyenc.

**Substrat i sòl** – Roques calcàries. Sòl irregular, pedregós o rocallós, carbonàtic, molt sec a l'estiu.

reduir-ne la superfície a mitjà termini. Localment és afectat per la realització de treballs forestals no selectius.

Es tracta d'un matollar estès secundàriament per desforestació, que en el paisatge primigeni es devia limitar a vessants solells rocallosos.

### ► Hàbitats CORINE

32.1311 Cadequers (màquies o garrigues amb abundància de *Juniperus oxycedrus arborescent*), no litorals  
*Rhamno-Quercetum cocciferae* Br.-Bl. et O. Bolòs (1954) 1957

*Quercetum cocciferae* Br.-Bl. 1924

*Quercetum rotundifoliae* Br.-Bl. et O. Bolòs (1956) 1957

etc.

### ► Tipus d'hàbitats d'interès comunitari

5210 Màquies i garrigues amb *Juniperus* spp. arborescents, no dunars

### ► Flora principal

	dom.	ab.	sign.	sec.
<b>Estrat arbustiu</b>				
<i>Juniperus oxycedrus</i> subsp. <i>oxycedrus</i> (càdec)		•	•	
<i>Rosmarinus officinalis</i> (romani)		•		
<i>Juniperus phoenicea</i> subsp. <i>phoenicea</i> (savina)			•	
<i>Quercus coccifera</i> (coscoll)			•	
<b>Estrat herbaci</b>				
<i>Rubia peregrina</i> (rogeta)		•	•	
<i>Brachypodium retusum</i> (llostó)		•		
<i>Thymus vulgaris</i> (farigola, timó)				•

### ► Distribució dins el territori català

Prepirineus (sobretot els centrals) i, més localment, territoris aussegàrric, sicòric i catalanídic central meridional; fins a uns 1.000 m d'altitud.

### ► Usos i problemes de conservació

Sense ús.

El càdec és sensible als incendis, ja que té un creixement lent i no es regenera amb facilitat. En zones amb sòl més o menys profund el creixement del bosc pot

### ► Superfície cartografiada

3.374,0510 ha

