

34k Prats sabanoides d'albellatge (*Hyparrhenia hirta*), de vessants solells de les contrades marítimes

► Aspecte

Prats de més d'1 m d'alçària, d'aspecte ufanós durant l'època plujosa i pallosos la resta de l'any. Dominats per les tofes, d'un bru rogenc, de l'albellatge (tant la subespècie típica com la *pubescens*), responsables de l'aspecte sabanoide del gramenet, les quals, juntament amb altres plantes herbàcies altes, com el fonoll, la ruda o el trèvol pudent, constitueixen un estrat herbaci superior. L'estrat inferior està dominat pel llistó, tot i que encara queda força espai hàbil perquè hi germinin, a la primavera, moltes plantes anuals. En conjunt, el recobrimet vegetal és sempre superior al 75 % i sovint arriba al 100 %. S'hi poden fer, excepcionalment, algunes mates xeròfiles, com ara la ginesta vera.

► Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Terra baixa: contrades marítimes subhúmedes.

Ambients que ocupa – Comunitat termòfila que es desenvolupa generalment en costers solells, normalment no gaire allunyats de la influència marina.

Clima – Mediterrani marítim subhúmit.

Substrat i sòl – Tant substrats calcaris com silícis.

► Flora principal

	dom.	ab.	sign.	sec.
Estrat arbustiu				
<i>Spartium junceum</i> (ginesta vera)			•	
Estrat herbaci superior				
<i>Hyparrhenia hirta</i> (albellatge)	•			•
<i>Convolvulus althaeoides</i> (corretjola de serp)		•		•
<i>Psoralea bituminosa</i> (trèvol pudent)		•		
<i>Lathyrus clymenum</i> (veçot)				•
<i>Foeniculum vulgare</i> (fonoll)				•
<i>Euphorbia characias</i> (lleteresa vera)				•
<i>Ruta angustifolia</i> (ruda)				•
Estrat herbaci inferior				
<i>Brachypodium retusum</i> (llistó)		•		
<i>Phagnalon saxatile</i> (ullastre de frare)				•
<i>Anthyllis tetraphylla</i>				•
<i>Heteropogon contortus</i>				•
<i>Carlina corymbosa</i> (card cigrell)				•
<i>Reichardia picroides</i> (cosconilla)				•
<i>Alyssum maritimum</i> (caps blancs)				•
<i>Sonchus tenerrimus</i> (lletsó fi)				•
<i>Galium maritimum</i> (espunyidella blanca)				•

► Distribució dins el territori català

Principalment als territoris ruscinic i catalanídic. De 20 a 600 m d'altitud.

► Usos i problemes de conservació

Tradicionalment pasturat per ovelles i cabres.

Es troba en regressió per l'abandó de l'activitat ramadera i per la disminució dels incendis forestals, que fa que ràpidament sigui envaït per una brolla alta de ginesta vera. Encara que menys, també està amenaçat per la urbanització.

El seu manteniment va també lligat a la utilització del foc com a factor de rejuveniment.

► Hàbitats CORINE

34.634 Prats sabanoides d'albellatge (*Hyparrhenia hirta*), de vessants solells de les contrades marítimes

Hyparrhenietum hirta-pubescens A. et O. Bolòs et Br.-Bl. 1950

► Tipus d'hàbitats d'interès comunitari

Cap.

► Superfície cartografiada

8.535,7923 ha

