

IMPLEMENTACIÓ DEL PROGRAMA DE CRIBATGE EN URGÈNCIES I INTERVENCIÓ BREU DIFERIDA



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut




Bellvitge
Hospital



Institut Català
de la Salut

Prevalence of hazardous and harmful drinking in the HUB



PREVALENÇA DEL CONSUM DE RISC I PERJUDICIAL D'ALCOHOL ALS SERVEIS D'URGÈNCIES HOSPITALARIS

Estudio	Mètode	% general	% homes	% dones
Bernstein et al, 1996, Subst Abus 17:179-184 (Boston)	CAGE	28% 15% dependència		
Hungerford et al, 2003, Am J Emerg Med 21:14-22 (West Virginia)	AUDIT (18-39 a)	43%		
Adams et al, 1992, J Am Geriatr Soc 40: 1236-1240	CAGE (≥65 a)	14%	23%	4%
Lapham et al, 2000, Addiction 93:1231-39 (Thailand)	AUDIT		40%	8%
Bernstein E et al 2009, Acad Emerg Med (Boston)	Structured interview	32%		


XARXA DE CURES EN PROBLEMES D'ALCOHOL

AMBULATORI

INGRESSAT

ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA

**UNITAT DE
DESINTOXICACIÓ**



OBJECTIUS DEL PROGRAMA

Realitzar una intervenció oportunista en el servei d'urgències destinada a detectar, avaluar i informar als pacients amb consum nociu de l'alcohol.

1. Al servei d'urgències es realitzarà una intervenció oportunista amb els següents mètodes:

- a) Detecció mitjançant el SIAC
- b) Consell mínim mitjançant material específic
- c) Derivació per avaluació i consell posterior adequat al tipus de consum i a la patologia associada

2. Intervenció breu diferida a primària (basada en programa beveu menys)

ALGORITME D'ACTUACIÓ

URGÈNCIES

ISCA

POSITIU

NEGATIU



Pauteu profilaxi de l'abstinència si s'escau

Patró de consum	Codi	Nom SAP
Consum risc o perjudicial	305.02/2	Ingesta alcohol excessiva episòdic
Consum perjudicial	305.00/1	Intoxicació alcohòlica aguda
	305.01/2	Ingesta alcohol excessiva continu
Dependència alcohòlica	303.91/4	Dependència alcohòlica
	291.0/2	Sd abstinència alcohòlica amb deliri
	291.81/2	Síndrome o símptomes abstinència alcohol

INGRES HOSPITALARI

ALTA A DOMICILI

Interconsulta: INF.CL.
PREV.ALCOHOLISME

1. TRÍPTIC EDUCATIU
2. DERIVACIÓ PER INTERVENCIÓ BREU:
 - a) METGE DE FAMILIA

AVALUACIÓ DE LA IMPLEMENTACIÓ DEL PROGRAMA

Mesures principals

Percentatge de pacients cribats a urgències

Percentatge de pacients positius remesos per a control

Percentatge de pacients positius que acudeixen a control

Percentatge de pacients als qual es realitza la intervenció diferida (mesurat per consulta a primària -gestió de casos- o per entrevista telefònica)

Mesures secundàries

Avaluació dels canvis en les actituds i la pràctica dels metges d'urgències respecte al screening sistemàtic

AVALUACIÓ DE L'EFECTIVITAT DEL PROGRAMA

Mesures principals:

Nombre de begudes estàndard per setmana

Nombre d'episodis de "binge drinking "(> 4 begudes per a les dones, i > 5 begudes per als homes) en els darrers 30 dies

Percentatge de pacients que supera els límits de consum de baix risc en l'últim mes segons el programa "beveu menys".

Mesures secundàries:

Conseqüències negatives potencials i actuals relacionades amb l'alcohol

Patrons d'atenció mèdica a la primària i la utilització del tractament relacionats amb l'alcohol els serveis mesurat per la revisió de l'utilització de la xarxa assistencial a la primària

Regla de la disposició a canviar els patrons de consum ("readiness to change").