

Formacions de saüc racemós (*Sambucus racemosa*), gatell (*Salix caprea*), gerdera (*Rubus idaeus*)..., de les clarianes forestals, a l'estatge subalpí (i al montà)



Bosquina de saüc racemós als Pirineus centrals. A. Ferré i J. Carreras

Aspecte

Bosquines i matollars que poden correspondre a etapes més o menys avançades de reconstitució del bosc i, en conseqüència, tenen una composició florística variable i un desenvolupament divers dels estrats arbustiu i arbori baix. Pot tractar-se de matollars densos de gerderes, de bosquines amb saüc racemós i gatells, o bé de bosquets amb gatells, bedolls, pins o avets. A les àrees de clima més humit dels Pirineus occidentals, hi abunden els esbarzers del grup *glandulosus* i el saüc racemós, que són, en canvi, rars a la part oriental de la serralada.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques

Estatge subalpí. Muntanya mitjana: estatge montà.

Ambients que ocupa

Clarianes força antigues en boscos subalpins i montans de pi negre, d'avet o de pi roig.

Clima

Medioeuropeu o subalpí.

Substrat i sòl

Preferentment sòls àcids o acidificats, allà on s'han produït processos de nitrificació intensa a conseqüència dels factors microclimàtics induïts per la desforestació.

Flora principal

	dom.	ab.	sign.	sec.
Estrat arbori <i>Salix caprea</i> (gatell) <i>Sorbus aucuparia</i> (moixera de guilla) <i>Betula pendula</i> (bedoll)		•	•	• •
Estrat arbustiu <i>Rubus idaeus</i> (gerdera) <i>Sambucus racemosa</i> (saüc racemós) <i>Rubus</i> gr. <i>glandulosus</i>	•	•	• • •	
Estrat herbaci <i>Epilobium angustifolium</i> <i>Fragaria vesca</i> (maduixera) <i>Epilobium montanum</i> <i>Urtica dioica</i> (ortiga major) <i>Dryopteris filix-mas</i> (falguera mascle)			• • •	• •




Saüc racemós. X. Font



Gerdera. A. Ferré

Distribució dins el territori català

Pirineus i territori catalanidic septentrional (Montseny).



Sintàxons o altres unitats tipològiques que hi corresponen

Sambuco racemosae-Rubetum idaei O. Bolòs 1979

Usos i problemes de conservació

Ús

Sense ús, eventualment s'hi recol·lecten gerds.

Conservació

Sense problemes de conservació coneguts. En alguns sectors el creixement del bosc pot reduir-ne la superfície a mitjà termini. L'abandonament d'activitats forestals extractives, també. Normalment aquestes bosquines substitueixen, per evolució natural, els herbassars pioners d'*Epilobium angustifolium* (hàbitat 31.8711).

Indicadors d'interès de conservació

Riquesa florística (biodiversitat)	(IC1)	2
Raresa florística	(IC2)	1
Forma d'implantació territorial	(IC3)	3
Estadi successional (grau de maduresa)	(IC4)	2
Valor biogeogràfic (endemicitat)	(IC5)	2
Extensió territorial (freqüència dins el territori català)	(IC6)	2
Interès de Conservació	(IC)	12

Grau d'amenaça	(A)	1
-----------------------	------------	----------

Tipus d'hàbitats d'interès comunitari

(annex I de la Directiva 97/62/UE) corresponents

Cap.

Unitats de la llegenda de la Cartografia dels hàbitats a Catalunya (1:50.000) que el representen

31w Clarianes de bosc amb *Epilobium angustifolium*, gerderes (*Rubus idaeus*), gatell (*Salix caprea*)..., de l'estatge subalpí (i del montà).

Unitat EUNIS corresponent

G5.85 Shrubby clearings.